

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE CLERMONT-FERRAND  
(Tél. 92-97-11 - Postes 440 & 449)

ABONNEMENT ANNUEL  
15 F

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, HAUTE-VIENNE, PUY-DE-DOME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Cité Administrative d'Assas, rue Pélissier,  
CLERMONT-FERRAND.

C. C. P. : CLERMONT-FERRAND 5.503-17

Supplément n° 1 au Bulletin n° 54 de MARS 1965.-

## A V E R T I S S E M E N T S . - A R B R E S F R U I T I E R S

TAVELURE DU POIRIER.- Les dernières pluies ont permis les premières contaminations par ascospores. (germes provenant des périthèces, organes de conservation de la maladie se formant dans les feuilles tombées à l'automne).

Etendre immédiatement à tous les Poiriers le traitement précédemment conseillé (s'il y a lieu, attendre, que le stade sensible C 3 soit atteint).

Dans les vergers traités dès réception de notre note précédente (Bulletin n° 54 du 19 Mars) renouveler la protection dans quelques jours.

TAVELURE DU POMMIER.- La maturité des périthèces de cette Tavelure est très avancée et les prochaines pluies risquent d'être contaminatrices.

Sur les variétés à débourrement précoce, ayant atteint ou dépassé le stade C3 - D, ce qui est actuellement le cas dans certaines situations de la Circonscription, effectuer un premier traitement (voir au verso, le tableau des stades-repères).

Dans les autres vergers, il importe de mettre en place ce premier traitement dès que les bourgeons atteindront ce stade.

CECIDOMYIE DES POIRETTES.- Le début du vol, en élevage et dans la nature, vient d'être observé. Dans les vergers de Poiriers où des dégâts sont à craindre (après la nouaison, petites poires déformées contenant de nombreux petits vers ; par la suite des poirettes noircissent et tombent) effectuer, par beau temps, un traitement avec un produit à base de D.D.T., d'H.C.H., de LINDANE ou de PARATHION.

## I N F O R M A T I O N S . - A R B R E S F R U I T I E R S

OIDIUM DU POMMIER.-

Nous rappelons, que dans les vergers intéressés par cette maladie, les traitements doivent être entrepris dès que le débourrement est bien amorcé.

Les traitements doivent être fréquents, les pulvérisations abondantes.

MONILIA DE L'ABRICOTIER.- Les conditions météorologiques de ces derniers jours ont été favorables à cette maladie. Nous rappelons qu'en plus du traitement effectué au débourrement, il doit être envisagé un traitement avant et après la floraison.

Clermont-Ferrand, le 26 Mars 1965.

Le Contrôleur chargé des  
Avertissements Agricoles

A. LECLERC.

L'Inspecteur de la Protection  
des Végétaux :


P. DENIZET.

Imprimerie de la Station de CLERMONT-FERRAND  
Directeur-Gérant : L. BOUYX.


P114

Tableau n° 2 — STADES-REPÈRES DU POMMIER


bourgeon proprement dit



bouton de la fleur



fleur



ovaire et fruit

